



Counter[®] FC-15%G
INSECTICIDA

**TERBUFOS /INSECTICIDA- NEMATICIDA
GRANULADO**

Organofosforado sistémico con actividad insecticida, acaricida y nematicida, de aplicación al suelo, con buen efecto de choque y actividad residual.

Por su actividad sistémica también actúa sobre parásitos de los órganos aéreos. Interfiere la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Terbufos: S-[[[1,1-dimetil etil] tio] metil] O,O-dietil fosforoditioato (Equivalente a 150 g de i.a./kg)	15.0
INGREDIENTES INERTES:	
Complejo de celulosa.	85.0
TOTAL	100.0

REG.: RSCO-INAC-0163-344-005-015

CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOSIS
MAÍZ SORGO	Gallina ciega (<i>Phyllophaga spp</i>) Mayate rayado (<i>Colaspis spp</i>) Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>) Gusano de la semilla (<i>Hylemya cilicrura</i>) Gusano de alambre (<i>Melanitus spp</i>)	7 kg/ha
PLÁTANO	Nematodos (<i>Radopholus similis</i>) (<i>Meloidogyne spp</i>) (<i>Helicotylenchus spp</i>) Picudo negro del banano (<i>Cosmopolites sordidus</i>)	20 g/mata
CAÑA DE AZÚCAR	Comején o termitas (<i>Reticulitermis flavipes</i>)	15 a 20 kg/ha
AGAVE*	Gallina ciega (<i>Phyllophaga spp.</i>) (<i>Cyclocephala spp.</i>)	7 a 8 kg/ha

* Exclusivo para uso en plantaciones menores de cinco años.

INSTRUCCIONES DE USO

PERÍODO DE REINGRESO: Espere 48 horas después de la aplicación para reingresar a las áreas tratadas. Cuando existan caminos, casas o pasos dentro o cerca de las áreas tratadas, deben colocarse rótulos que indiquen “CAMPO TRATADO CON INSECTICIDA - NO INGRESE”, especificando la fecha de reingreso.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Se aplica directamente sobre el suelo con equipo Gandy para granulados.

RECOMENDACIONES Y APLICACIÓN:

Agave: COUNTER® FC-15% G debe aplicarse con una bomba de espalda para granulados.

EN PLANTACIONES ESTABLECIDAS: Aplicar alrededor de la base del hijo una banda semicircular de 40 a 60 cm.

EN PLANTACIONES NUEVAS: Aplicar en banda completa sobre la superficie del suelo alrededor de la planta una vez transplantada.

Plátano: COUNTER® FC-15% G debe aplicarse con una bomba de espalda para granulados.

EN PLANTACIONES ESTABLECIDAS: Aplicar alrededor de la base del hijuelo una banda semicircular de 40 a 50 cm; aplicar 2 a 3 veces al año según la experiencia y el historial nematológico de la región.

EN SIEMBRAS NUEVAS: Aplicar en banda completa sobre la superficie del suelo alrededor del rizoma o de la planta una vez transplantada. No se establece intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

Maíz y Sorgo: Una aplicación, al momento de la siembra, colocando los gránulos en una banda de 18 cm. sobre el surco, detrás de la zapata de la sembradora y delante de la rueda prensadora.

MUY IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO DEBE APLICARSE MEZCLADO CON EL FERTILIZANTE. NO DEBE USARSE SOLO A MENOS QUE SE APLIQUE CON EQUIPO ESPECIAL PARA APLICAR INSECTICIDAS GRANULADOS. El intervalo entre la última aplicación y la cosecha en estos cultivos es de 60 días y queda determinado de por sí, por el uso temprano del producto.

Caña de azúcar: Aplicar 15 kg de **COUNTER® FC-15% G** en el fondo del surco, lo cual es una práctica efectiva en el momento de la siembra; en las socas se recomienda una labor de desaporque y enseguida que termine la cosecha, aplicar el insecticida en el fondo del surco tapando con tierra.

CONTRAINDICACIONES: No deje producto en las aplicadoras. Aplique todo el producto depositado en el equipo de aplicación.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **COUNTER® FC-15% G** con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Insecticida COUNTER® FC-15% G
IRAC MoA Grupo 1 Inhibidores de la colinesterasa,
Subgrupo 1B organofosforados
Acción nerviosa
Terbufos 15.0% equivalente a 150 g i.a./kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el polvo durante la aplicación. No permita que el producto caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: **COUNTER® FC-15% G** contiene al ingrediente activo terbufos que pertenece al grupo químico de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso.

Antídotos y tratamiento específico: Aplicar de 1.0 a 2.0 mg. (adulto) y 0.02 y 0.05 mg. (menores de 12 años) /kg de peso corporal de sulfato de Atropina por vía intravenosa, cada 10 minutos, hasta atropinización completa. Si el paciente no responde satisfactoriamente al Sulfato de Atropina, aplíquese reactivadores de la colinesterasa, aplique lentamente TOXOGONIN (Cloruro de obidoxima) 250 mg. vía intravenosa (1 ampollita) para adultos 1-2 veces con intervalo de 2 horas y en niños menores de 12 años 4-5 mg. /kg. de peso corporal. 2-PAM, el cloruro de protopam o similares. Si se usa vía intravenosa una sola dosis de 1 g. en adultos o de 0.25 g. en niños. Si se dispone de cloruro de protopam, inyéctese lentamente por vía intravenosa una dosis inicial de 500 mg. en casos medianamente graves o de 1 g. casos graves, aplicar a los 30 minutos otra dosis de 500 mg. Repetir si es necesario a los 30 minutos otra dosis de 500 mg. En cada caso, limpiar vías respiratorias, aplicar oxígeno si es necesario, determinar y observar niveles de colinesterasa en sangre. Observe al paciente por lo menos durante 24 horas. Están contraindicados la morfina, fenotiazinas, succinicolina, epinefrina y los barbitúricos. ¡No administre atropina a una persona cianótica! Signos y síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, debilidad, mareos, náusea, vómito y diarrea; ansiedad, ambliopía, calambre y opresión torácica. Los signos comprenden: sudoración, miosis, lagrimeo, salivación y otras secreciones excesivas del aparato respiratorio. En caso de intoxicación severa se puede manifestar cianosis, sacudidas musculares incontrolables, convulsiones, pérdida de control de esfínteres, en casos graves: coma y paro respiratorio.

Signos y síntomas de intoxicación: Efectos muscarínicos: Puede provocar convulsiones, temblores, ansiedad, alergias, malestares gástricos, alteraciones de la conciencia y pérdida del conocimiento. Algunos otros síntomas de intoxicación son tos, irritación del tracto respiratorio, enrojecimiento de la piel, sensación de quemazón y picor, enrojecimiento y dolor en los ojos, dificultad respiratoria, episodios asmáticos. Así como cefaleas, anorexia, náuseas y vómitos.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](https://www.facebook.com/amvacmexico) [in amvac mexico](https://www.linkedin.com/company/amvac-mexico)