

**QUIZALOFOP / HERBICIDA**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE



Es un Herbicida sistémico post-emergente, formulado como concentrado emulsionable.

**ASSURE® II** es un herbicida sistémico, selectivo. Es absorbido por las raíces y hojas, siendo translocado en 1-2 horas por toda la planta tanto por el xilema como por el floema y acumulado en los meristemos apicales y brotes subterráneos, destruyéndolos. Inhibe la acetil CoA carboxilasa e impide la biosíntesis de los ácidos grasos. En las plantas perennes alcanza rápidamente los órganos subterráneos e impide el desarrollo de los brotes. También actúa sobre las plántulas que germinen después de la aplicación. Es absorbido por los coleóptilos de las gramíneas e impide cualquier nueva emergencia en un período medio, en primavera, de 3 semanas.

<b>COMPOSICIÓN PORCENTUAL:</b>	<b>% EN PESO</b>
<b>Ingrediente activo:</b> <b>Quizalofop-p-etil:</b> Etil (R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi)fenoxi]propionato (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	10.50%
<b>Ingredientes Inertes:</b> Emulsificantes, solventes	89.50%
	Total: 100.0%

**Registro No.: RSCO-HEDE-0262-X0115-009-10.50**

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	RECOMENDACIONES
PAPA (SL)	Hierba agria ( <i>Paspalum conjugatum</i> ) Zacate pata de ganso ( <i>Eleusine multiflora</i> )	400 - 500	Realizar aplicación total en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura. El volumen de aplicación de agua sugerido es de 300 L/ha
Piña (160)	Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> ) Zacate bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Caminadora ( <i>Rottboellia cochichinensis</i> )	700-1500	Realizar una aplicación foliar total dirigida a la maleza en post-emergencia cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura; volumen de aplicación sugerido 200 L de agua/ha.
Agave (2)	Zacate de agua ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Hierba agria ( <i>Paspalum conjugatum</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Pasto rosado ( <i>Rhynchelytrum roseum</i> ) Cola de ardilla ( <i>Eragrostis mexicana</i> )	500-1250	Realizar una aplicación foliar total dirigida a la maleza en post-emergencia cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura; volumen de aplicación sugerido 200 – 300 L de agua/ha.

**Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 12 horas

**( ) Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Con el equipo de protección puesto, agite el producto y abra cuidadosamente el envase embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Gire presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Coloque agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión e iniciar la agitación, vierta la cantidad recomendada de **ASSURE® II** y complete la capacidad del tanque con el agua necesaria.

Mantener la agitación durante la mezcla y aplicación del producto al cultivo. El volumen de agua utilizado es de 300 mL/ha.

**CONTRAINDICACIONES:** Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr), o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

**INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUBSTANCIAS:** No mezclar **ASSURE® II** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

**Herbicida ASSURE II**  
**HRAC MoA Grupo 1A Inhibidores de la**  
**Acetil CoA Carboxilasa (ACCCase)**  
**Quizalofop-p-etil 10.5%**  
**equivalente a 100 g i.a./L**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los párpados abiertos y lávelos con agua limpia 15-20 minutos

**En caso de contacto con la piel o ropa:** Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

**En caso de ingestión:** Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.

**En caso de inhalación:** Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar, acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y de respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

**QUIZALOFOP / HERBICIDA**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE

**Assure® II**

Distribuidor:  
**AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
**AMVAC®**  
An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja  
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010  
Tel: (33) 3110 1976  
800 00 AMVAC (26822)

**HECHO EN MÉXICO**



[www.amvac.com.mx](http://www.amvac.com.mx)

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)