



**BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS/ FUNGICIDA BIOLÓGICO**  
**POLVO HUMECTABLE**

Fungicida biológico el cual combate el desarrollo de hongos fitopatógenos que se presentan en el área foliar de las plantas

Trabaja a través de diversos mecanismos tales como, competencia de nutrientes, exclusión del sitio, liberación de componentes celulares durante el crecimiento.

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% p/p</b>
Bacillus amyloliquefaciens (Equivalente a 40 g de i.a./kg con una concentración de $2.0 \times 10^9$ UFC/g)	4.0%
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Encapsulante, soporte, surfactante, protectantes y espesante	96.0%
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

Registro No.: RSCO-FUNG-0190-0615-002-4.0

## INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	ENFERMEDADES	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
AJO, CEBOLLA, CEBOLLIN, PORO	SIN LIMITE	Mancha púrpura ( <i>Alternaria porri</i> )	1.0 - 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 230-330 L de agua/ha.
AGUACATE	SIN LIMITE	ANTRACNOSIS ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )	1.0 - 2.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido: 452-552 L/ha.
BERENJENA CHILE JITOMATE OKRA PIMIENTO MORRÓN PAPA TOMATE VERDE	SIN LIMITE	CENICILLA POLVORIENTA ( <i>Leveillula taurica</i> )	1.0 - 2.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia del patógeno. Volumen de aplicación sugerido: 250-350 L /ha.
CALABAZA CALABACITA CHAYOTE MELÓN PEPINO SANDÍA	SIN LIMITE	CENICILLA ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	1.0 - 2.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días. Iniciar las aplicaciones al momento en que se detecte la presencia del patógeno. Volumen de aplicación sugerido: 377-477 L/ha.
FRESA ZARZAMORA	SIN LIMITE	CENICILLA ( <i>Sphaerotheca humuli</i> )	1.0 - 2.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días, al encontrarse los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido: 277-377 L/ha.

### Tiempo de reentrada a la zona tratada:

#### ( ) Intervalo de Seguridad:

- Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite.

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Rompa la esquina superior izquierda con unas tijeras (nunca con la boca), procurando no entrar en contacto directo con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta  $\frac{3}{4}$  de su capacidad, posteriormente agregue **AKORDE®** y termine de llenar con agua. Se aplica por aspersion con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

### CONTRAINDICACIONES

Aplicar AKORDE® en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes.

**INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUBSTANCIAS.** No se recomienda mezclar AKORDE® con otros plaguicidas

**MANEJO DE RESISTENCIA**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado en el manejo, preparación y aplicación del producto (camisa de manga larga y pantalón largo, goggles o lentes, guantes de caucho, nitrilo o neopreno, zapatos y calcetines).

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de intoxicación no induzca el vómito. Llame al médico. Si hay contacto con los ojos lave con abundante agua limpia la zona de contacto. Si hay contacto con la piel lave con abundante agua limpia y jabón la zona de contacto

**EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).**

Distribuidor:

**AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**



An American Vanguard Company

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia  
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: (33) 3110 1976

800 00 AMVAC (26822)

[www.amvac.com.mx](http://www.amvac.com.mx)