



Bravo[®] Gold

FUNGICIDA

DIFENOCONAZOLE + CLOROTALONIL

FUNGICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Ayuda al control tizón temprano en solanáceas con un excelente efecto de control.

Bravo Gold es un fungicida compuesto de dos ingredientes activos que combina la acción sistémica del difenoconazole y la acción de contacto de clorotalonil, para el control de las enfermedades foliares de los cultivos del grupo de solanáceas.

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Difenoconazole: 3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil-4-clorofenil éter (Equivalente a 50 g de i.a./L a 20 °C)	3.96
Clorotalonil: Tetracloroisoflato-nitrilo (Equivalente a 500 g de i.a./L a 20 °C)	39.61
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, anticongelante, antiespumante, estabilizante, ajustador de pH, quelante, conservador y disolvente.	56.43
TOTAL	100.00

REG.: RSCO-FUNG-MEZC-0315-0213-064-79.21

INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS: BRAVO® GOLD es un fungicida compuesto de dos ingredientes activos que combina la acción sistémica del difenoconazole y la acción de contacto de clortalonil,

APLICACIÓN FOLIAR:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/HA)	OBSERVACIONES
Jitomate (0) Chile (0) Tomate de cáscara (0) Papa (0) Berenjena (0)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	1.0 a 1.5	Realice dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.
Calabaza (0) Calabacita (0) Melón (0) Pepino (0) Sandía (0)	Mildiú	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.0 a 2.5	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 500 L/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Para abrir el envase de **Bravo Gold**, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, con la misma tapa de forma invertida, colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello. Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión con la dosis del producto recomendada, mantenga agitación constante. Complete el resto con agua.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto. Este producto debe aplicarse en cobertura total sobre el follaje, con equipo terrestre convencional con un volumen de agua de 500 L/ha.

CONTRAINDICACIONES

No aplique **BRAVO® GOLD** en horas de calor intenso. No aplique **BRAVO® GOLD** con vientos superiores a 8 km/h. No aplique **BRAVO® GOLD** a través de riego por goteo.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico en el cultivo y dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con las siguientes formulaciones: Concentrado emulsionable, suspensión concentrada, gránulos dispersables en agua, polvo humectable y suspensión acuosa encapsulada. Es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. Para mezclas que se realicen con otros productos, se deben utilizar productos que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos aquí recomendados.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Fungicida BRAVO® GOLD
FRAC MoA
Difenoconazole: G1: triazoles
(3.96%, equivalente a 50 g. de i.a./L a 20°C)
Clorotalonil: M: cloronitrilos
(39.61%, equivalente a 500 g. de i.a./L a 20°C)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se utilice. Almacénesse en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

BRAVO® GOLD contiene al ingrediente activo difenoconazole que pertenece al grupo químico G1: triazoles y al ingrediente activo clorotalonil que pertenece al grupo químico M: cloronitrilos. **Signos y síntomas de intoxicación:** Puede causar irritación en los ojos y de moderada a severa irritación en la piel, si no se enjuaga inmediatamente con abundante agua. Puede producir reacciones alérgicas temporales caracterizadas por el enrojecimiento de los ojos, una ligera irritación bronquial y enrojecimiento o erupción en la piel expuesta. Las personas que presentan reacciones alérgicas temporales responderán a un tratamiento con cremas antihistamínicas y/o esteroides sistémicos.

Antídoto y tratamiento: No existe un antídoto específico, dé tratamiento sintomático. Si el producto es ingerido, no provoque el vómito, haga lavado gástrico evitando la aspiración de contenidos gástricos. Administre tratamiento sintomático y de sostén.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja

Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010

Tel: (33) 3110 1976

800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)

Bravo® Gold
FUNGICIDA