



Rutvac® G

Inductor y activador radicular.

GRANULADO

Promueve la generación de raíces secundarias y pelos absorbentes.

Rutvac® G potencializa el metabolismo de enraizamiento aportando fitohormonas de enraizamiento a la vez que activa hormonas endógenas, esto induce a una mayor actividad rizosférica y contacto con los nutrientes en el suelo.

Ingredientes Activos

	%
Microelementos metálicos	9.87%
Bioreguladores (500 ppm)	0.05%
Diluyentes y acondicionadores	90.08%
	Total 100.00%

Registro RSCO: 054/III/02

INSTRUCCIONES DE USO

Rutvac® G debe ser incorporado, mediante cualquier sistema que garantice una distribución uniforme del producto, generalmente deber ser aplicado con fertilizantes que se emplean al momento de la siembra o con productos insecticidas o nematicidas de aplicación al suelo (evitar el contacto de los productos fitosanitarios con la semilla).

Realice aplicaciones cuando el suelo tenga una temperatura mayor a los 15°C, es importante que la zona en que se aplique garantice su contacto con el agua y así promover su liberación del inerte.

Rutvac® G puede ser mezclado con otros agroquímicos, ya que es compatible con la mayoría de los productos de acción neutra, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla con otros productos.

Instrucciones de aplicación

CULTIVO	DOSIS Kg/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Brócoli, repollo (col), col de Bruselas, brócoli chino.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Lechuga, girasol, cártamo, achicoria, envidia.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Ajo, cebolla, cebollín.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Papa, tomate, chile, berenjena, tabaco.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Pepino, melón, sandía, calabaza, calabacita.	2.5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Camote.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Nochebuena, gerbera.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Fresa, manzana, pera, membrillo, durazno, ciruela, cereza, almendra, zarzamora, frambuesa, rosa.	5-7.5	Fresas después del trasplante y a la tercera fertilización y en frutales aplicar al suelo en la línea de la copa del árbol.
Piña.	8-15	Aplicar al suelo en banda 2 meses después del trasplante.
Plátano.	8-15	Aplicar al suelo cada 3 meses después de un deshije
Aguacate, canela.	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Cítricos (toronja, limón, naranja, cidra, pomelo).	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Mango, pistacho.	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Guayaba	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Vid	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Algodón	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Nogal	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Café	5-25	Aplicar al suelo en la copa del árbol al inicio de la temporada de lluvias.
Frijol, haba, garbanzo, soya, chícharo, tamarindo, jícama, alfalfa, cacahuete, ejote.	2.5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.
Trigo, cebada, avena, maíz, arroz, sorgo, mijo, caña de azúcar.	5	Aplicar durante la fertilización de fondo en mezcla con fertilizantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal completo y adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, googles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y en caso de tenerlos, utilizar materiales como aserrín para absorción

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. **Si hay contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. **Si se ingiere:** Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Alcama 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670
Tel: 01 (33) 3110 1976
01 800 00 AMVAC (26822)
www.amvac.c.om.mx