AMERICAN VANGUARD

SOil® San

MEJORADOR DE SUELO

MATERIA ORGÁNICA CONCENTRADA Y ENRIQUECIDA

POLVO GRANULAR

Favorece y promueve la toma de nutrientes y actividad microbiana, mejora la estructura del suelo.

Soil San Vía suelo incrementa la materia orgánica lo que activa la microbiología del suelo, mejora la capacidad de intercambio catiónico y aumenta espacios porosos haciendo una estructura de suelo más favorable para la nutrición y actividad radicular. Vía foliar protege nutrientes permitiendo una traslocación más efectiva.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	
Sustancias húmicas	90 %
Ácidos fúlvicos	41.73 %
Ácidos húmicos	48.27 %
Potasio (K)	9 %
Impurezas de origen orgánico	1 %
Total	**100** %

Registro No.: RSCO-0132/VII/97

INSTRUCCIONES DE USO

SOilSan® es un derivado de leonardita que contiene ácidos húmicos y fúlvicos adicionado con potasio (K). Es un mejorador de las condiciones químicas y físicas del suelo por su aportación de materia orgánica. **SOilSan®** además es un adyuvante para aplicaciones foliares, facilita la penetración de agroquímicos por medio foliar.

SOilSan® se recomienda para su aplicación en los siguientes cultivos y dosis:

SOil® San

MEJORADOR DE SUELO

APLICACIÓN AL SUELO:

CULTIVO	Riego (kg)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Tomate, Chile, pepino, calabaza, melón, sandía, berenjena y papa.	0.5-1.5	Aplicar la dosis baja en plántula, la media a inicio de floración y la dosis alta al amarre de los frutos
Ajo, brócoli, lechuga, cebolla, cebollín y esparrago.	0.5-1.5	Aplicar la dosis baja a las 4 hojas verdaderas; la dosis media a los 15 días después
Garbanzo, cacahuate, soya y frijol	0.5-1.5	Aplicar la dosis baja en plántula, la media a inicio de floración y la dosis alta al amarre de las vainas
Fresa, frambuesa, zarzamora y arándano.	0.5-1.5	Aplicar la dosis baja al inicio de floración y repetir mensualmente con la dosis alta
Alfalfa	0.5-1.5	Aplicar dosis media en cultivo recién establecido y la dosis alta en alfalfa en producción.
Maíz, sorgo, trigo, arroz, cebada y avena	0.5-1.0	Aplicar al primer nudo y al embuche
Vid, manzana, pera, durazno, ciruelo y nogal	1.0-2.0	Aplicar la dosis alta al inicio de la floración y al amarre; la dosis baja después de la cosecha.
Mango, aguacate, cítricos	1.0-1.5	Aplicar la dosis baja al rebrote y a la floración, la dosis alta al amarre de los frutos
Banano	1.0-1.5	Aplicar al independizarse el hijuelo.
Vid	1.0-2.0	Aplicar cuando exista actividad radicular.
Caña de azúcar	1.0-1.5	Aplicar a la siembra y repetir aplicación a la formación de hijuelos.
Ornamentales	0.5-1.0	Aplicar dosis baja al trasplante; la media al botón floral
Algodón	0.5-1.5	Aplicar la dosis baja al inicio de crecimiento vegetativo, la dosis media al cuadreo y la dosis alta a inicio de floración
Mezcla con herbicidas	0.5-1.0	Aplicar 0.5 Kg en preemergencia y 1.0 Kg en post emergencia
Mezcla con fertilizantes al suelo	3.0-5.0	Aplicar 3.0 kg para suelo liviano, 4.0 kg en suelo arcilloso y 5.0 kg para suelo sódico

APLICACIÓN FOLIAR:

CULTIVO	g / 200 litros de agua	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Hortalizas	50-150	Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a la mezcla con los productos de aplicación foliar.
Granos y leguminosas	50-100	Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a la mezcla con los productos de aplicación foliar.
Árboles frutales	100-200	Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a la mezcla con los productos de aplicación foliar.
Frutillas	50-100	Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a la mezcla con los productos de aplicación foliar.
Ornamentales	50-100	Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a la mezcla con los productos de aplicación foliar.
Algodón	50-100	Disolver mezcla en agua suficiente y posteriormente agregar a la mezcla con los productos de aplicación foliar.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para lograr una adecuada suspensión de **SOilSan®**, se recomienda disolverlo en agua antes de hacer la mezcla definitiva para la aplicación, asegurando que el producto este completamente disuelto.

INCOMPATIBILIDAD: SOilSan® es compatible con la mayoría de los agroquímicos, con excepción de aquellos productos que tengan un pH bajo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad.

SOilSan® es incompatible con nitrato de calcio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Para el manejo de este producto, utilice el equipo de protección personal completo (gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol, goggles, guantes y botas de neopreno).

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos.

Si se ingiere: Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno.

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

An American Vanguard Company

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670
Tel: 01 (33) 3110 1976
01 800 00 AMVAC (26822)
www.amvac.c.om.mx

SOil® San
MEJORADOR DE SUELO